

- Bembidium fasciol. ascendens* Dan.: St Martin-Vésubie, bords du Borréon.
— Isère; Entre-deux-guiers (V. Planet).
- Bembidium coeruleum* Serv.: Nice, bords du Paillon. — Var: Cuers. —
Avignon (Dr. Chobaut).
- Bembidium coerul. Bugnioni* Dan.: Avignon (Dr. Chobaut).
- Bembidium tibiale* Dft.: St Martin-Vésubie. — Aude, environs de Belcaire
(coll. Puel, Béziers).
- Bembidium Redtenbacheri* Dan.: Mont Dore en Auvergne (coll. Puel,
Béziers) — Isère, les Echelles (massif de la Grande-Charthreuse)
(V. Planet) — St Martin-Vésubie.
- Bembidium complanatum* Heer: St Martin-Vésubie.
- Bembidium longipes* Dan.: St Martin-Vésubie, bords du Borréon.
- Bembidium atrocoeruleum* Steph.: Aude, environs de Belcaire (coll. Puel,
Béziers).
- Amara lantoscana* Fauvel: M^t Scandaïl, alp. marit. 1902.
- Polydrosus (Chlorodrosus) Abeillei* Desbr.: Courmes, alp. marit. 1902.

K. Holdhaus, Wien:

- Vom Monte Pavione in den cadorischen Dolomiten (1902, Holdhaus): *Plectes Creutzeri Kircheri* Germ. hfg. — *Orinocarabus alpestris Bertolinii* Kr., *Linnei* Panz. — *Trechus pallidulus* Gglbr. nicht selten, *Breiti* Gglbr., 4 Stück unter tief liegenden Steinen unterhalb des Gipfels. — *Abax parallelopedus* Dej., *Beckenhaupti-Echeli* Bert. — *Pterostichus baldensis* Palae Müll. — *Tapinopterus placidus* Rosh., 3 Stücke unterhalb des Gipfels. — *Brososoma baldense* Rsh., selten. — *Amara pasubiana* Dan. (nicht *dolomitana* Dan.!) in Anzahl. — *Absidia Birnbacheri* Krauss, in geringer Anzahl, auch 1 ♀, die Stücke sind, wie jene vom Rolle-Pass, ganz schwarz. — *Otiorrhynchus tridentinus* Dan. nicht selten.
- Orinocarabus concolor Redtenbacheri* Géh.: In der Rauris (Otto) und auf dem Hoch-Obir (Klimsch).
- Orinocarabus alpestris Hoppei* Germ.: 1 Stück von den Gailtaler Alpen (Gugg-Alm in der Sifflitz), das eine Mittelstellung zwischen *alpestris*-Stammform und *Hoppei* einnimmt (Holdhaus).
- Orinocarabus Linnei* Panz.: Gailtaler Alpen (Sifflitz) 1 Stück (Holdhaus).
- Cychnus angustatus* Hoppe: Dobratsch (Berger).
- Cychnus Schmidti* Chaud.: Wolaya-See in den karnischen Alpen (Holdhaus).
- Asmerinx Knauthi* Gglbr.: Dobratsch, 1 Stück (Holdhaus).
- Reichenbachia Klimschi* Holdh.: Admont (Steiermark), 3 ♂♂ (Hauptmann Zellich) (Holdhaus det.).
- Bythinus Halbherri* Rtrr.: Campo grosso (Piano della Fugazza, Südtirol), 1 ♂ oberhalb der Finanz-Kaserne unter einem tief in grasreichen Boden eingebetteten Stein (25. 7. 1902, Holdhaus), 1 ♀ ebenda (Ganglbauer, Holdhaus det.).
- Hypocyrtus Pirazzolii* Baudi: Am Ufer des Loibl-Baches bei Ferlach in Kärnten (17. 8. 1902, Holdhaus leg. et det.) unter Steinen, welche auf nicht allzu feuchtem Letten aufliegen, schwärmt abends, 2 Exemplare.
- Pteroloma Forströmi* Gyll.: Bei Metnitz in Kärnten (Klimsch).

- Agyrtes bicolor* Cast.: 1 Stück am Wullanig bei Villach (Holdhaus leg. et det.).
Ptinus austriacus Rtrr.: Villach und Sachsenburg in Oberkärnten, einige Stücke (Holdhaus leg. et det.).
Liodes carpathica Gglbr.: Braunsberg in Mähren (Janaček).
Hymenorus Doublieri Muls.: Villach, 1 Stück (Holdhaus leg., Gglbr. det.).
Dirrhagus Sahlbergi Mannh.: 1 Stück bei Sachsenburg in Oberkärnten an frisch gescheitertem Buchenholz (Holdhaus leg., Gglbr. det.).
Troglorrhynchus baldensis Czwal.: Monte Baldo unterhalb des Gipfels unter sehr grossen Steinen, welche in grasreichem Boden eingebettet sind, gewöhnlich in den tieferen Partien an den Graswurzeln: 14 Stück (22. 7. 1902, Holdhaus et Otto leg.).

Alle Belegstücke für meine Angaben im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien.

J. Breit, Wien:

- Carabus violaceus Mülleri* Born (cf. Ref. 152): Auf der Passhöhe des Arlberg.
Carabus Linnei Panz.: Hochalpin auf dem Monte Pasubio (Lessinische Alpen).
Nebria austriaca Gglbr.: Hochalpin auf dem Wolfendorn am Brenner.
Nebria Bremii Germ.: Hochalpin auf dem Hafelekar (Karwendelgebirge).
Scarites laevigatus thelonensis Bon.: Am Lido von Venedig.
Dyschirius extensus Putz.: Am Neusiedlersee (Ungarn).
Patrobus assimilis Chaud.: Auf der Passhöhe des Arlberg.
Perigona nigriceps Dej.: Im Wienerwald, Windisch-Garsten (Dr. Skalitzky).
Platynus longiventris Mannh.: Prater in Wien; Ober-Weiden (Marchfeld, östl. Nieder-Oesterr.).
Platynus cyaneus Dej.: Am Ufer des Inn bei Innsbruck.
Pterostichus inquinatus Sturm: Neusiedlersee.
Pterostichus elongatus Dft.: Neusiedlersee.
Pterostichus Kokeili Mill.: Hochalpin auf dem Wolfendorn am Brenner.
Pterostichus micans Heer: Campo grosso (Lessinische Alpen), Monte Baldo, Monte Generoso (Tessin).
Tapinopterus placidus Rshr.: Campo grosso (Lessinische Alpen).
Molops edura Dej.: Monte Grigna, Campo grosso.
Amblystomus metallescens Dej.: Am Neusiedlersee.
Bythinus simplex Baudi: Piano della Fugazza (Lessinische Alpen).
Ptiliolum Sahlbergi Flach: Untersberg (Südliches Niederösterreich).
Spaniophaeus laticollis Mill.: Oberweiden (Marchfeld, östl. Niederösterreich).
Meligethes humerosus Rtrr.: Subalpin, Stuhleck (Semmering-Gebiet).
Hypocopus lathridioides Motsch.: Brucker Haide (Oestl. Niederösterreich).
Aphodius plagiatus L. (*forma typica*): Hochalpin auf dem Monte Pasubio; auch am Neusiedlersee.
Anoxia scutellaris Muls.: Monte Pasubio (Lessinische Alpen).
Bruchus Schlerethi Rtrr.: Prag (Dr. Skalitzky).
Meloe tuccius Rossi: Neusiedlersee.
Otiorrhynchus Heeri Strl.: Monte Grigna.
Otiorrhynchus velutinus Germ.: Südliche Umgebung von Wien.